fiche Recif_Mise en page 1 11/05/11 16:55 Page1

Herbicide pour le contrôle des adventices dicotylédones

RÉCIF® 20

(metsulfuron-méthyle 20% WG)

L'herbicide sélectif, polyvalent et simple d'utilisation pour contrôler les dicotylédones de vos cultures

- Efficace sur de nombreuses adventices
- Longue période d'utilisation : utilisable entre les stades 3 feuilles et dernière feuille déployée des céréales (BBCH 13 à 39)
- Améliore significativement la productivité des prairies permanentes
- Permet de contrôler la végétation des jachères et d'éviter leur fructification
- Utilisable en blé de panification et de production de semence
- Granulés dispersables :
  - mise en solution rapide et complète,
  - miscibilité totale

Cultures	Dose homologuée	Stade Limite d'application
Blé tendre d'hiver	30 g/ha	BBCH 39, dernière feuille étalée
Blé dur d'hiver	30 g/ha	BBCH 39, dernière feuille étalée
Orge d'hiver	30 g/ha	BBCH 39, dernière feuille étalée
Orge de printemps	30 g/ha	BBCH 39, dernière feuille étalée
Seigle	30 g/ha	BBCH 39, dernière feuille étalée
Triticale	30 g/ha	BBCH 39, dernière feuille étalée
Prairies permanentes	20 g/ha	10 jours avant la remise en pâture
Contrôle des jachères	5 à 20 g/ha	Suivant les espèces

SUMI AGRO France
SUMITOMO CORPORATION GROUP

fiche Recif_Mise en page 1 11/05/11 16:55 Page2

RÉCIF® 20

(metsulfuron-méthyle 20% WG)

CARTE D'IDENTITÉ

Composition : Metsulfuron-méthyle 20% WG
Formulation : WG - Granulés dispersables
AMM n° 2100216 délivrée le 3/01/2011. Détenteur de l'AMM SUMI AGRO France.
Classe HRAC : groupe B
Mode d'action : inhibition de la synthèse de l'ALS
Conditionnement : 100 et 200 grammes
Classement : Xi, N, R43, R50/53
Ne pas utiliser sur sols artificiellement drainés
DAR Céréales : Stade limite d'application BBCH 39
Utilisation automne : 1 an sur 2

Sensibilité des adventices à RÉCIF® 20

PS : peu sensible S: sensible TS : très sensible

Achillée millefeuille	S	Mercuriale	TS	Ravenelle	TS
Amaranthe réfléchie	S	Mourons	TS	Renoncules	TS
Ammi majus	TS	Ortie	TS	Renouée liseron	TS
Arabette	TS	Pensée	TS	Renouées des oiseaux	S
Armoise	S	Pissenlit	TS	Repousses de betterave	TS
Bleuet	PS	Coquelicots	TS	Repousses de colza	TS
Calépine	TS	Ethuse	TS	Repousses de tournesol	TS
Capselle	TS	Fumeterre	PS	Rumex	TS
Carotte sauvage	TS	Gaillet	PS	Sanve	TS
Céraiste	TS	Géraniums	TS	Scandix Peigne de Vénus	TS
Chardons	TS	Gremil	TS	Séneçon	TS
Chénopodes	S	Lamiers	TS	Tussilage	S
Chrysanthème	PS	Matricaire	TS	Véronique de Perse	S
Colchique	S	Plantain	TS	Véronique feuille de lierre	PS
Laiterons	S	Potentille	S		

Informations particulières

A la suite d'une céréale désherbée avec RÉCIF® 20 à la dose recommandée, les cultures suivantes peuvent être implantées :

A l'automne suivant la récolte	graminées fourragères, colza, céréales, pois et féverole d'hiver, jachères à base de graminées, légumineuses, moutarde
Au printemps suivant la récolte	betteraves, endives, haricots, lin, maïs, pois protéagineux, pomme de terre, soja, sorgho, tournesol

• Utilisations sur jachère (spontanée ou semée) : se reporter précisément aux recommandations mentionnées sur l'étiquette pour le mode d'emploi et le choix de la culture suivante.
• Utilisation sur prairies permanentes : se reporter précisément aux recommandations mentionnées sur l'étiquette

Mise en œuvre et compatibilité de RÉCIF® 20 :
RÉCIF® 20 peut être associé à de nombreuses spécialités afin d'élargir le spectre d'action et de réduire les doses dans le cadre des bonnes pratiques agricoles : on respectera l'ordre de mélange suivant : spécialités WP/WG, puis EC/SC, puis huileuses. Ces mélanges restent sous la responsabilité de l'utilisateur et doivent faire l'objet d'un test préalable.

© Comm' desMots - srousseau@commdesmots.fr - Imprimé en France - 2011

SUMI AGRO France
SUMITOMO CORPORATION GROUP
25, boulevard de l'Amiral Bruix 75016 PARIS
Tél : 01 53 67 68 40
www.sumiagro.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.